

Quadro 1 - Artigos levantados nas bases de dados Lilacs, Scielo e Medline sobre revisão integrativa.

Procedência	Título	Autores	Periódico	Considerações
Brasil	Uso de suturas uterinas compressivas na hemorragia pós-parto	Alves ALL, Silva LB, Melo VH	Femina 2014;42(6)	As suturas uterinas realizaram mudanças no tratamento frente a uma HPP grave, quando ocorre a falha no tratamento farmacológico, preservando a fertilidade.
Brasil	Associação entre síndromes hipertensivas e hemorragia pós parto	Ruiz MT, Azecedo CT, Ferreira, MBG, Mamede MV.	Rev Gaúcha Enferm 2015;36, esp: 55-61.	As síndromes hipertensivas e HPP são as principais causas de morte materna, no entanto tem-se uma escassez sobre a temática.
Brasil	Análise da hemorragia no parto vaginal pelos índices de eritrócitos e hematócrito.	Gabrielloni MC, Armellini CJ, Barbieri M, Schirmer J.	Acta Paul Enferm 2014;27(2):186-93.	Os índices de hemoglobina e hematócrito são maiores no parto espontâneo sem episiotomia, sendo que a hemorragia é maior no parto com fórceps.
Brasil	Cesariana a pedido materno	Câmara R, Burlá M, Ferrari J, Lima L, Junior JÁ, Braga A, Filho Rezende J.	Rev Col Bras Cir 2016;43(4):301-10.	Estudo de revisão no qual mostra que a cesariana tem menores taxas de hemorragias, transfusões e complicações.
Brasil	Obesidade durante a gravidez: resultados adversos da gestação e do parto.	Silva JC, Amaral AR, Ferreira BS, Petry JF, Silva MR, Krelling PC.	Rev Bras Ginecol Obstet 2014;36(11):509-13.	O estudo mostra que as mulheres com maiores IMC tem maiores chances de hemorragia de grande porte.
Brasil	Recusa a transfusão de sangue por gestantes e puérperas Testemunhas de Jeová.	Bezerra APA, Cesar MB, Lara SRG	Rev Min Enferm 2015;19(4):1043-51.	São várias estratégias colocadas nas pesquisas a fim de evitar a transfusão sanguínea.
Brasil	Uso de balões intrauterinos em pacientes com hemorragia pós-parto	Alves ALL, Silva LB, Melo VH.	Femina 2014;42(4).	O uso de balões intrauterinos é uma terapêutica usada na HPP a fim de evitar uma histerectomia, além de ser simples com maior facilidade de estar disponível para o uso.
Brasil	Validação de questionário para avaliar a vivência e autoconfiança nas	Nomura RMY, Novoa VANN, Pimenta	Rev Bras Ginecol Obstet 2014;36(11):519-24.	É importante o profissional ter o conhecimento de suas habilidades

	emergências na assistência ao parto vaginal.	BSO, Nakamura M, Moron AF.		para um bom atendimento nas emergências.
Brasil	Importância da implementação de protocolos de ação na pré-eclâmpsia.	Santos BCL, Souza LNB, Coutinho HHO, Almeida LL, Rios LLG, Lavareda PHB, et al.	Rev Med Minas Gerais 2015;25(4):502-10	Os pacientes com PE, 76,8% evoluíram para cesárea e 8% tiveram HPP
Brasil	Mortalidade materna por hemorragia no Estado de Santa Catarina, Brasil	Martins HEL, Souza ML, Salazar MAA.	Rev Esc Enf USP 2013;47(5):1025-30.	É necessário colocar na prática os avanços tecnológicos e científicos para que todos profissionais saibam atuar nos casos de hemorragia como também preveni-las.
Colômbia	Ligadura de artérias hipogástricas en hemorragia postparto severa	Hoz FJE, Cortés OEZ, Santiago LO.	Revista CES Medicina 2016;30(1):26-34.	A ligadura bilateral das artérias hipogástricas é eficaz, sendo uma técnica conservadora. no controle da HPP grave
Colômbia	Resultados obstétricos y perinatales en pacientes con o sin analgesia obstétrica durante el trabajo de parto	Gutiérrez DLP, Chamorro JAE, Gutiérrez WEP, Clavijo CAL, Flórez REH.	latreia 2016;29(3):263-9	Sem relação entre a analgesia e HPP. Foi encontrado apenas maiores chances de parto instrumental, nos partos com analgesia.
Colômbia	Guía de práctica clínica para la prevención y el manejo de la hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico.	Alianza Cinets	Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 2013;64(4):425-52.	Principais cuidados de prevenção: manejo ativo, uso de ocitócitos e o clameamento do cordão umbilical entre dois a três minutos após o nascimento.
Colômbia	Reporte de caso y revisión de la literatura: hiperpirexia como efecto secundario posterior a la administración de misoprostol por vía sublingual en el manejo de la hemorragia posparto.	Pacheco FHM, Benítez CPZ	Rev Colom Anestesiol 2013;41(1):65-8.	Como segunda linha terapêutica temos as prostaglandinas. A via sublingual do misoprostol tem o seu início de ação de forma mais rápida.
Colômbia	Frecuencia, indicaciones y complicaciones de la histerectomía obstétrica en el Hospital Universitario San José de Popayán, 2006-2010. Estudio de cohorte.	Peña RLC, Varela ILP, Figueroa GAC	Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 2013;64(2):121-5.	A histerectomia é segura para a HPP, quando ocorre a falha do tratamento farmacológicos e procedimentos cirúrgicos.

Colômbia	Cómo describen el cuidado de enfermería las mujeres que presentaron hemorragia postparto.	Franco CCA	Aquichan [online] 2013;13(1):17-26.	Na ausência do cuidado da enfermeira, poderá aumentar a duração do trabalho de parto.
Colômbia	Hemorragia posparto y ascariasis: presentación de un caso	Flores MLM, Ahumada IE, Mantilla DNO, Alarcón CEO, Rosales JDP, Arrieta LP	Salud Uninorte Barranquilla (Col.) 2013;29(1):134-8.	Como tratamento da HPP foi usada a massagem, medicamentos (ocitocina, methergin, misoprostol e carbetocina, no entanto, sem resultado, evoluindo para a histerectomia
Colômbia	Incidencia de hemorragia posparto con base en el uso terapéutico de uterotónicos. resultados maternos en un hospital de mediana complejidad de Bogotá, Colombia,	García LFL, Fernández DPR, Cerón CGZ, Romero JAR	Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 2017;68(3):218-27.	O método de diagnóstico da HPP deve ser avaliado quanto a sua eficácia para que a intervenção seja iniciada no momento correto.
Peru	Histerectomía obstétrica en el Hospital San Bartolomé, Lima, 2003 – 2015	Cabrera JR, Ramos SC, Siccha GC, Chomba MP, Morales CP	Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 2017;63(1):27-33.	O pré-natal sendo controlado não evita o risco da mulher passar pela histerectomia. A cesárea aparece com um risco maior para a realização da histerectomia
Peru	Sutura B-Lynch modificada en la atonía uterina post-cesárea: reporte de caso	Gamarra M, Sánchez M.	Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 2014;60(1).	Uso de sutura de B-Lynch modificada após uma atonia uterina
Peru	Complicaciones maternas de la cesárea en gestantes a término em período expulsivo em um hospital general de Lima, Perú.	Puma J, Díaz J, Caparó C.	Rev Med Hered 2015;26:17-23.	A cesárea durante o período expulsivo pode trazer complicações graves.
Peru	Complicaciones del parto vertical en el Instituto Nacional Materno	Ayarza MC, Mosqueira AC, Brush AC, Silva RM.	Horiz Med 2014;14(1):31-7.	Como complicações do parto vertical, a HPP aparece em 5% (6 pacientes)
Venezuela	Uso del balón SOS Bakri en atonía uterina. Serie de casos en un hospital universitario de tercer nivel.	Kovacs JR, Veroes J, González L, Blanco MG, Bello F.	Rev Obstet Ginecol Venez 2013;73(2):88-8.	O tamponamento com balão SOS Bakri é eficaz na parada do sangramento em casos de atonia uterina, e após a sua inserção, a estabilização é em

				cerca de duas horas
Venezuela	Misoprostol en la conducta activa en el tercer período del parto: dosis mínima efectiva.	Salazar DS, Olivar FA, Carpio IEP, Blanco MG	Rev Obstet Ginecol Venez 2015;75(3):155-63.	A dose do misoprostol é efetiva desde a dosagem de 200 a mais elevadas doses.
Chile	Fatores asociados e indicaciones para a práctica de cesariana: um estudo caso-controllo.	Oliveira AN	Rev Port Med Geral 2013;29(3)	O estudo mostra um menor risco de hemorragia e maiores chances de infecção e reinternamento após a cesárea.
Chile	Dosis efectiva 90 de oxitocina profiláctica en infusión luego del alumbramiento durante operación cesárea en pacientes en trabajo de parto o cesárea primaria: Un estudio dosis-respuesta con distribución secuencial arriba-abajo	Pérez A, Kattan E, Lacassie HJ.	Rev Chil Obstet Ginecol 2017;82(1):84-6.	A paciente que passa pelo trabalho de parto e após é submetida a cesárea, necessitam de maiores níveis de ocitocina para contração do útero após o processo cirúrgico.
Chile	Sutura de B-Lynch en hemorragia postparto por inercia uterina. Experiencia Hospital Dr. Luis Tisné Brousse 2013-2016	Guzmán C, Narváez P, Lattus J, Seguel A, Lizana S.	Rev Chil Obstetr Ginecol 2017;82(5).	A Sutura de B-Lynch, é um procedimento seguro e rápido. Como recomendação que ele seja usado primeiramente, antes de outros procedimentos.
Bolívia	Dispositivo para la Hemorragia puerperal (balón hemostático)	Novak AP, Vania VGM, Ibeth VPL	Rev Cient Cienc Med 2013;16(1)	A maioria dos casos apresentam boa resposta no uso do balão, respondendo em alguns casos de forma melhor com uso de ocitócito.
Cuba	Caracterización de la hemorragia obstétrica grave en terapia intensiva.	Balsameda AG, Pérez YM, Matinez MER.	Rev Ciencias Médicas de Pinar del Río 2016;20(4): 426-33.	O choque hipovolêmico aparece como a principal causa de complicação e internamento na terapia intensiva devido um sangramento obstétrico.
Cuba	Aplicación de suturas compresivas de Hayman ante hemorragia obstétrica postparto. Presentación de un caso	Cabrera YH, Águila LC, Hernández MR.	Medisur 2017;2:261-5.	A sutura compressiva de Hayman é uma técnica simples que mostrou ser eficaz na hemorragia vinda de uma atonia uterina, e foi utilizada em 77,3%, destes,

				61,5% não apresentaram complicações.
Cuba	Caracterización de las pacientes con hemorragia uterina puerperal en las que se utilizó misoprostol.	Sánchez AML	Rev Cubana Obstet Ginecol 2014;40(2).	A via sublingual juntamente com a dose retal aparecem como a melhor terapêutica.
Cuba	Influencia del alumbramiento activo sobre la morbilidad materna por hemorragia posparto.	Fernández AS, Pérez VG, Cid IL, Iglesias GR, Gámez AMA	Rev Cub Med Mil 2013;42(3).	As complicações pós-parto podem ser diminuídas com um manejo ativo no terceiro período do parto. Assim como com maiores casos de internação em UTI e histerectomia total na conduta expectante.
Cuba	Comportamiento epidemiológico de la histerectomía obstétrica	Rodriguez NA, Arce RC, Hidalgo EC, López JB, Cernuda IM, Cabrera PC	Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología 2013;39(2):128-34.	A atonia aparece como a principal causa de hemorragia
Honduras	Sutura b-lynch modificada como profilaxis en pacientes con riesgo para hemorragia posparto. Serie de casos.	González ALL, Serrano RDF, Irías YE, Urbina MCB.	Rev Med Hondur 2016;84(1/2).	A sutura provou ser suficiente para evitar a HPP. Não aparecem muitas publicações sobre o uso de suturas como profilaxia, por isso é necessário ensaio clínico randomizado neste tema.
Honduras	Hemorragia postparto por causas diferentes a atonia uterina severa en el hospital escuela universitario de Tegucigalpa	Bustillo MC, Aguilar NM.	Rev Fac Cienc Méd 2013;10(2):19-25.	O trauma de canal de parto foi o maior fator para a ocorrência da HPP. Porém a maioria das mulheres não foi encontrado um fator de risco relacionado a hemorragia. Para o manejo mais da metade usaram medicamentos uterotônicos e cristalóides.
México	Revisión de cavidad uterina instrumentada gentil frente a la revisión manual y su relación con la hemorragia posparto	Vilarreal ALC, López JPC.	Enfermería Universitaria 2013;20(1):21.	É demonstrado que é maior o número de casos de HPP nas mulheres em que a revisão manual é realizada. Já com a revisão instrumentada é menor o risco de ocorrer a HPP, sendo realizada por profissional treinado.

México	Eficacia y seguridad del taponamiento uterino para control de hemorragia y disminución de histerectomía obstétrica. cohorte histórica en Nuevo León, México, 2013.	Oviedo YR, Vera EAL, Cruz JJB, Salazar GJM.	Rev Colomb Obstet Ginecol 2015;66:186-94.	O tamponamento controlou o sangramento em mais de 95%. Sendo assim é considerado um tratamento seguro evitando uma histerectomia.
Espanha	Oxitocina frente a carbetocina para prevenir hemorragias posparto tras cesárea.	Díaz BN, Samper NC, Medina NC, Díaz LF, Jover AM, Ingelmo JMR	Rev Peru Ginecol Obstet 2013;30(5).	Como prevenção da HPP poderá ser usado tanto ocitocina quanto carbetocina.
Índia	Hemorragia pós-parto e hipertensão induzida pela gravidez durante cesariana de emergência em segmento uterino inferior: dexmedetomidina para nosso resgate.	Hariharan, U	Rev Bras Anesthesiol 2017;67(5):538-40.	A medicação poderá melhorar o resultado geral de uma paciente com HPP, tendo benefícios no sangramento uterino.
Sem localização	Hemorragia pós-parto.	Delaney L, Pozza L, Cunha B, Schreiner L.	Acta Méd. (Porto Alegre) 2016;37(7).	É necessário o conhecimento da prevenção, tratamento e diagnóstico de forma rápida e precoce, portanto os profissionais devem estar preparados frente a HPP.