

Quadro 1 – Principais dados dos artigos incluídos na revisão integrativa, 2020

Autor/ periódico/ano	Título do artigo	Tipo do estudo/objetivo	Resultados
Ludman et al., Am J Prev Med 2015 [36]	Perspectives in implementing a primary care-based intervention to reduce alcohol misuse	Estudo randomizado/Testar se uma intervenção na atenção primária reduziria o uso indevido de álcool entre pacientes que foram identificados como de risco para o uso abusivo	O estudo indicou que a intervenção breve aplicada a um contexto bem elaborado pode ser eficaz para reduzir o uso abusivo de álcool
Souza et al., Physis, 2015[13]	O alcoolismo, suas causas e tratamento nas representações sociais de profissionais de Saúde da Família	Estudo qualitativo/ Compreender representações sociais do alcoolismo construídas por profissionais de APS, atuando em Unidades de Saúde da Família	Os saberes construídos pelos profissionais no cotidiano não têm como base exclusiva os conhecimentos técnico-científicos e as suas representações sociais ao paciente alcoolista se baseiam no contexto de precariedade social e moral
Hirdes et al., Aletheia, 2015 [03]	Prevenção ao uso de álcool e outras drogas e tratamento na Atenção Primária à Saúde em um município do Sul do Brasil	Estudo qualitativo/ Investigar as ações de prevenção e tratamento a usuários de álcool e outras drogas na Atenção Primária à Saúde	A atenção primária se constituiu como recurso indispensável para as ações de prevenção e tratamento. A articulação do conhecimento teórico com a prática clínica diária ainda precisa ser qualificada, mediante o atendimento conjunto e ou a discussão e planificação conjunta de projetos terapêuticos singulares
Glass et al., Addict Sci Clin Pract, 2017 [31]	Rethinking alcohol interventions in health care: a thematic meeting of the International Network on Brief Interventions for	Estudo qualitativo/ Sintetizar evidências recentes sobre triagem e intervenção breve e definir direções para pesquisas, práticas e políticas à luz dessas evidências.	O estigma parece ser uma barreira na relação entre paciente e profissional de saúde, de modo que se torna um empecilho ao fornecimento e recebimento de cuidados; precisa ser

	Alcohol & Other Drugs (INEBRRIA)		abordado para poder levar ajuda a quem precisa; a pesquisa ajudará a delinear a melhor forma de abordá-lo.
Bradley et al., JAMA Inter Med, 2018 [20];	Alcohol-Related Nurse Care Management in Primary Care: A Randomized Clinical Trial	Estudo randomizado/Testar se intervenções breves combinadas com tratamento medicamentoso e orientação ao paciente que desejava tratamento adequado (intervenção CHOICE), em comparação com o tratamento usual, melhorou os resultados do consumo de álcool entre pacientes	A intervenção Choice não diminuiu o consumo excessivo de álcool ou problemas relacionados, apesar do aumento do envolvimento em cuidados relacionados ao álcool
Malvezzi et al., Rev Trab, Educ Saúde, 2018 [12]	Cuidado aos usuários de álcool na atenção primária: moralismo, criminalização e teorias da abstinência	Estudo qualitativo/ Conhecer e analisar as crenças e as práticas de saúde no cuidado ao usuário de álcool na atenção primária à saúde	Atitudes moralizantes e preconceituosas, com uma prática que criminaliza o uso de álcool, principalmente nas classes menos favorecidas, pautada por condutas normatizadas. Foco na eliminação dos riscos e na abstinência total, em consonância com o modelo biomédico, e distante das necessidades dos sujeitos e da complexidade que envolve a questão
Soares et al., Rev Bras Enferm 2019 [32]	Impacto da intervenção breve e arteterapia para usuários de álcool	Delineamento intragrupo/ Identificar o impacto da intervenção breve em conjunto com a arteterapia em usuários que consomem álcool	A intervenção breve associada à arteterapia resultaram em grande impacto para a redução do consumo de álcool, pois possibilitou um ambiente holístico para vivência de conflitos, dificuldades e ansiedades com menor carga de sofrimento,

			contribuindo para a reabilitação de seu transtorno mental.
Pereira et al., Rev Bras Enferm 2019 [33]	Efetividade da intervenção breve grupal no uso nocivo de álcool na atenção primária à saúde	Estudo randomizado/ Verificar a efetividade da intervenção breve grupal realizada por enfermeiros, na redução do uso de risco e nocivo de álcool em usuários de um serviço de atenção primária à saúde	A intervenção breve grupal realizada pelo enfermeiro no contexto da atenção primária foi efetiva, pois apresentou uma redução estatisticamente significativa nos scores de Audit, evidenciando-se fator crucial para redução do consumo de álcool em indivíduos com padrão de uso de risco ou nocivo
Martinez et al., Cad Saúde Coletiva 2019 [34];	Religiosity and patterns of alcohol consumption among users of primary healthcare facilities in Brazil	Estudo transversal/ Examinar a associação entre envolvimento religioso e padrões de consumo de álcool em uma amostra representativa de usuários de unidades de atenção primária à saúde de Ribeirão Preto, Brasil	Foram evidenciadas associações significativas entre padrões de consumo de álcool e as múltiplas dimensões da religiosidade, como afiliação religiosa, práticas religiosas, autopercepção do nível de religiosidade. Baixos níveis de ingestão de álcool foram detectados entre indivíduos que praticam sua religião, comparados com aqueles que não possuem uma religião e/ou não praticam uma
Santos et al., Ciênc Saúde Coletiva, 2019 [37]	Relação do uso de álcool e transtornos mentais comuns com a qualidade de vida de pacientes na atenção primária em saúde	Estudo transversal/ Mensurar a qualidade de vida de pacientes da atenção primária em saúde do município do Rio de Janeiro e verificar sua associação com transtornos mentais comuns, uso de álcool e aspectos sociodemográficos	Alta prevalência de desfechos em saúde mental associada a presença relevante do consumo de álcool em diferentes padrões se evidenciam como fatores que mais diminuem a qualidade de vida. Reiterando assim a relevância da capacitação dos profissionais e organização de serviços

			de atenção primária para o manejo destes agravos
Soares et al., Rev Bras Enferm 2020 [37]	Group Brief Intervention: effectiveness in motivation to change alcohol intake	Estudo randomizado/ Verificar a efetividade da intervenção breve grupal, realizada por enfermeiros, nos estágios motivacionais para a mudança do padrão de consumo de álcool.	Evidenciou-se que a intervenção breve foi efetiva ao aumento da motivação para a mudança do consumo nocivo de álcool, visto a melhora significativa nos scores motivacionais

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).